Licht bringen ins Dunkel

Hilfen zur Begleitung depressiver Menschen im Alter

Depressionssymptome

Hauptsymptome

- 1. Deprimierte Stimmung
- 2. Interessenverlust
- 3. Antriebsminderung

Depressionssymptome

Nebensymptome

- 1. Verminderte Konzentration, Aufmerksamkeit, Denkvermögen, Unschlüssigkeit
- 2. Vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen
- 3. Schuldgefühle, Gefühle von Wertlosigkeit
- 4. Suizidgedanken, versuche, Selbstverletzungen
- 5. Schlafstörungen
- 6. Verminderter oder gesteigerter Appetit
- 7. Psychomotorische Agitiertheit oder Hemmung

Somatisches Syndrom

Im Alter häufig

- 1. Interessenverlust
- 2. Mangelnde Fähigkeit, auf eine freundliche Umgebung oder freudige Ereignisse emotional zu reagieren
- 3. Frühmorgendliches Erwachen
- 4. Morgentief
- 5. Psychomotorische Agitiertheit oder Hemmung
- 6. Gewichtsverlust
- 7. Libidoverlust

Einordnung

- Abgrenzung zur Demenz
- Körperliche Ursache?
- Reaktion?
- Umgang des Patienten mit der Depression
- Kriegskind?

Anregungen für Begleiter

- Mich selbst kennen
- Meine Haltung
- Den Patienten kennen
- Grundsätzliches